



Registro notable del grisón (*Galictis vittata*) en el Parque Nacional Azul Meámbar, Honduras

*Noteworthy record of the great grison (*Galictis vittata*) in the Azul Meámbar National Park, Honduras*

Sergio José Midence López

RESUMEN

Galictis vittata es reconocida como una especie de amplia distribución en el continente, pero muy rara de observar en el campo y con escasos reportes. Esta nota presenta un nuevo registro del grisón en Honduras, derivado del hallazgo de un individuo muerto por atropellamiento en la carretera CA-5, límite oeste del Parque Nacional Azul Meámbar. Desde que se tiene conocimiento de su presencia en Honduras, solo se tienen 41 registros conocidos. Este reporte constituye el registro más occidental conocido hasta ahora en el país, dado que no hay reportes de los departamentos fronterizos con El Salvador y Guatemala.

Palabras Clave: atropellamiento de fauna, grisón, Lago de Yojoa, ocurrencia, sitio RAMSAR.

ABSTRACT

Galictis vittata is recognized as a species with wide distribution on the continent, but very rare to observe in the field and with few reports. This note presents a new record of the grison in Honduras, derived from the discovery of an individual killed by a road accident on the CA-5 highway, the western limit of the Azul Meámbar National Park. Since its presence in Honduras has been known, there have only been 41 known records. This report constitutes the westernmost record known in the country, given that there are no reports from the border departments with El Salvador and Guatemala.

Key words: Great grison, fauna roadkill, occurrence, Yojoa lake, RAMSAR site.

El grisón (*Galictis vittata*) se distribuye desde el este de México, a través de Centro América hasta Perú, Bolivia, el norte de Argentina y el sur de Brasil (Reid, 2009; Cuarón, *et al.*, 2016). Se sabe que ocurre desde el nivel del mar hasta 1,200 msnm, en pastizales, e incluso en áreas cultivadas (Cuarón, *et al.* 2016), en pastos altos cerca del agua, y en bosques deciduos o siempre verdes (Reid, 2009). Aún se conoce poco de su hábitat e igualmente de sus hábitos en Venezuela se reportó un rango de acción de 4.2 km² para una hembra (Reid, 2009), y la densidad se ha estimado en 1–2.4 individuos por km² (Cuarón, 2016). Se alimenta de reptiles, aves y pequeños mamífe-

Relevancia:
*Nuevo registro del grisón (*Galictis vittata*) en Honduras.*

Proyecto Aldea Global, Col. Florencia Sur, #4044, Tegucigalpa.
Autor de correspondencia: sergio@pa-ghonduras.org

ros, e incluso medianos como *Dasyprocta punctata* (Reid, 2009). En cuanto a su distribución en el continente, en años recientes se reportaron nuevos registros en México (Contreras-Díaz, 2020; Hernández-Hernández, 2021; Lucas-Juárez, 2021), Colombia (Echavarría-Rentería, 2018), y en Argentina (Nigro, 2021) con los que se amplía el rango de distribución dentro de esos países. En el caso de Honduras, Marineros y Martínez-Gallegos (1989) mencionaron siete reportes anecdóticos distribuidos entre los Departamentos de Olancho, Atlántida y Cortés, registrados tanto dentro de límites de áreas protegidas como en sus inmediaciones, así como también en aldeas y áreas semiurbanas. Para el año 2014 se reportaron 32 registros independientes en el marco de un esfuerzo de foto-trampeo de 24,000 noches-trampa, desarrollado en 28 áreas diferentes e independientes, ubicadas en bosques húmedos de hoja ancha, desde humedales hasta bosques montaños; todos los registros ocurrieron solamente en el bosque lluvioso del Caribe y sus áreas agrícolas (Herrera y Castañeda, 2014). Un registro más reciente se reporta para la zona de amortiguamiento sur de la Reserva de la Biosfera del Río Plátano, donde para el año 2002, también había sido reportada su ocurrencia en esta área (Martínez, 2020). El 01 de noviembre del año 2021, Kevin Hernández, guardarecursos de Proyecto Aldea Global, logró el registro fotográfico del cadáver de un individuo adulto de grisón (*Galictis vittata*) (Figura 1), a inmediaciones del kilómetro 160 de la carretera CA-5, frente al restaurante La Naturaleza, en el sector conocido como Monte Verde (14.84267, -87.9640259). El evento probablemente derivó de un atropellamiento por vehículo automotor. Este es el primer registro de la especie en el Parque y el registro más occidental dentro de su distribución en el País, ya que no se tienen hasta ahora registros de la especie en los departamentos de Santa Bárbara, Copán y Ocotepeque, ni en los Departamentos fronterizos con El Salvador. Por la ubicación del hallazgo, y considerando que se conoce que el rango de hogar puede ser de 415 hectáreas (Yesen y Tarifa, 2003) o 420 hectáreas (Reid, 2009), se puede deducir que el individuo utilizaba tanto las zonas agrícolas y parches de bosque del área montañosa en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Azul Meámbar, así como las zonas inundables y pantanosas típicas del Lago de Yojoa (Figura 2), ambas áreas



Figura 1. Individuo atropellado de *G. vittata*, en la Carretera CA-5, a orillas del Lago de Yojoa, Municipio Santa Cruz de Yojoa, Cortés. Foto: Sergio J. Midence L.

incluidas dentro del sitio RAMSAR Sub-cuenca del Lago de Yojoa. El sitio RAMSAR también incluye el Parque Nacional Santa Bárbara, hacia el oeste del lago, y el registro indica que, a pesar de la presencia humana y el consecuente desarrollo socioeconómico en la región, el grisón encuentra condiciones favorables para su ocurrencia. *G. vittata* es considerada una especie de preocupación menor en la Lista Roja de la UICN dado que tiene una distribución amplia en el continente y ocupa hábitats con cierto grado de alteración debido a la actividad humana, pero se resalta también que los registros confirmados son escasos en toda su área de distribución (Cuarón *et al.*, 2016). Esta nota constituye el registro número 41 de la especie para Honduras. Es de hacer notar que la especie no está considerada como una especie amenazada en la Lista Roja de Especies Amenazadas para Honduras, del año 2021 (WCS, 2021). Los ejercicios de monitoreo que se están llevando a cabo en diferentes áreas protegidas del país son herramientas importantes para el registro de la ocurrencia de la especie; sin embargo, será útil diseñar investigaciones en sitios específicos donde se sabe de




Figura 2. Nuevo registro del grisón (*Galictis vittata*) en el Parque Nacional Azul Meámbar, Honduras.

su presencia, como en el Parque Nacional Azul Meámbar y sus alrededores para incrementar el conocimiento de sus hábitos y el uso del hábitat que frecuenta. Dado que la carretera CA-5 seguirá siendo una vía de transporte terrestre vital para la economía de la región, las organizaciones comanejadoras del Lago de Yojoa (AMUPROLAGO) y el Parque Nacional Azul Meámbar (Proyecto Aldea Global) podrían gestionar, ante los negocios establecidos a la orilla de la carretera donde ocurrió el hallazgo, los fondos para hacer y colocar rótulos y/o reflectores nocturnos que ayuden a minimizar los atropellamientos.

Agradecimientos

Se agradece el apoyo a Kevin Hernández e Ivo Alvarado, miembros de la organización Proyecto Aldea Global, por facilitar la fotografía de referencia para elaborar esta nota, y a la Institución, al Proyecto Aldea Global por permitir hacer pública la información sobre la diversidad biológica del Par-

que Nacional Azul Meámbar y al técnico Kenneth Roberto Calderón Arostegui por la elaboración del mapa del registro del grisón.

LITERATURA CITADA

- Cuarón, A.D., Reid F., González-Maya, J.F. y K. Helgen. 2016. *Galictis vittata*. The IUCN Red List of threatened species. e. T41640A45211961. <http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-1.RLTS.T41640A45211961.en>
- Contreras-Díaz C., L. Soría-Díaz, C.C. Astudillo-Sánchez, H. Domínguez-Vega, Y. Gómez-Ortiz y L. Martínez-García. 2020. Expansion of distribution range of the Greater Grison (*Galictis vittata*) in México. *Therya Notes*, 1:1-4
- Echavarría-Rentería J.D., Jiménez-Ortega A.M. y L. Palacios-Mosquera. 2018. New records of *Galictis vittata* (Schreber 1776) for the western slope of the Andes, Pacific region of Colombia. *Therya*, 9:185-189.
- Herrera, L. y F. Castañeda. 2014. Greater grison (*Galictis vittata* Schreber 1776) first cameratrap records in Honduras. Conference: XVIII Congreso de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación (SMBC) At: Copán Ruinas, Honduras.
- Hernández-Hernández, J.C., Elio Lagunes-Díaz. 2021. Registro del Grisón (*Galictis vittata* Schreber, 1776) en un humedal

- de Alvarado, Veracruz, México. *Mammalogy Notes*, 7:198.
- Lucas-Juárez, G., J.D. Lucas-Juárez, y J.M. Díaz-García. 2021. Nuevo registro del grisón mayor (*Galictis vittata*) en la Sierra Nororiental de Puebla, México. *Therya Notes*, 2:47–50.
- Marineros L., F. Martínez-Gallegos. 1989. *Guía de Campo de los Mamíferos de Honduras*. Instituto Nacional de Ambiente y Desarrollo. Tegucigalpa, Honduras.
- Martínez, M. e I. Sánchez. 2020. Confirmación de la ocurrencia de *Galictis vittata* en la Reserva del Hombre y la Biósfera del Río Plátano en tiempos de COVID-19. *Scientiae hondurensis*, 3:10–14.
- Nigro, N.A., N. Lodeiro Ocampo, D.G. Gnatiuk, K.A. Gnatiuk, M. Britez y M. Dombrowski. 2021. Confirmación de la presencia del hurón grande *Galictis vittata* (Mustelidae) en la República Argentina, tras treinta años sin registros. *Notas sobre mamíferos Sudamericanos*, 3:e21.5.2
- Reid, F. 2009. *Mammals of Central America & Southeast Mexico*. Oxford University Press.
- Yensen, E, y T. Tarifa. 2003. *Galictis vittata*. *Mammalian Species*, 727:1–8.
- Wildlife Conservation Society (WCS). 2021. *Lista roja de especies amenazadas de Honduras*. Tegucigalpa M.D.C.